

Q. (基礎問題精講 2B p93 演習 57)

$\frac{3\theta + (\pi + 2\theta)}{2}$  になる過程とその後の解に至るまでの解説をお願いします。

A.  $\sin 3\theta = \sin(\pi + 2\theta) \cdots \textcircled{1}$

から

$$\frac{3\theta + (\pi + 2\theta)}{2} = \frac{\pi}{2} + n\pi \cdots \textcircled{2}$$

が導かれる過程について説明致します。

まず①は、単位円上で角 $3\theta$ の位置と角 $(\pi + 2\theta)$ の位置の $x$ 座標が等しいことを表しています。

よって、これら 2 つの角の位置関係としては、次の 2 つの可能性が考えられます。

(i)  $3\theta$  と  $(\pi + 2\theta)$  は単位円上で完全に同じ位置にある

(ii)  $3\theta$  と  $(\pi + 2\theta)$  は $y$  軸に関して線対称な位置にある

(i) であるような場合は、

$$3\theta = (\pi + 2\theta) + 2\pi n \quad (n: \text{整数})$$

$$\therefore \theta = \pi + 2\pi n$$

をみたす必要がありますが、 $\theta$  のとりうる範囲は  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$  ですので、上式を満たす $\theta$  は存在せず、(i) の可能性は無視して良いことになります。

(ii) であるような場合は、解答の単位円の図にも記載されている通り、2 つの角を足して 2 で割った平均の角が、必ず $y$  軸上に来ることが分かりますので、②の式が成立することが分かります。

あとは②式を整理することで

$$\frac{5}{2}\theta + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + n\pi$$

$$\frac{5}{2}\theta = n\pi$$

$$\therefore \theta = \frac{2n\pi}{5}$$

となりますので、 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$  を満たす $\theta$  の値を調べると、

$$\theta = 0, \frac{2\pi}{5}$$

となることが分かるのではないかと思います。